


Andamento metereologico e fitosanitario melo 2022



Andamento meteorologico melo 2022

Andamento meteo **Aldeno**:
temperature massime e minime giornaliere






Bilancio fitosanitari melo 2022

METEO

Andamento meteo Cles




Andamento meteo Cles



Bilancio fitosanitari melo 2022

METEO

Andamento meteo Bleggio



Andamento meteo **Bleggio**



Bilancio fitosanitari melo 2022

AVVERSITA'/TEMATICA		
Ticchiolatura		
Oidio		
Colpo di fuoco		Centro val di non – Valsugana
Alternaria		Colline del Sarca – Fondovalle
Moria		
Afide lanigero	 	
Afide cenerognolo	 	Maggiore in fondovalle
Cimice asiatica	 	
Gelo		
Grandine		
Scottature		Gala nel fondovalle (T° > 35°C)
Pezzature	 	

Bilancio fitosanitari melo 2022




Bilancio melo 2022: pezzatura frutticini

	Rispetto al 2021	Rispetto al 2020	Rispetto al 2019	Rispetto alla media 10 anni (2011-2020)	Rispetto all'annata peggiore (2013)
Metà giugno	Da + 6 mm + 10 mm	Da -1 mm a -2 mm	da +4 a + 7mm	Da +2 a +4 mm	Da +9 a +16
Metà luglio	Da + 3 mm + 8 mm	Da -1 mm a - 5 mm	da +2 a + 6 mm	Da +1 a +3 mm	Da +8 a +13



- Si ipotizza un anticipo di raccolta di circa 5-7 giorni rispetto alla passata stagione

GRANDINE 2022



EVENTI PIU' SIGNIFICATIVI

Areale		Note
Centro Val di Non – Val di Cembra	Tassullo – Predaia – Ton – Spiazzo di Segonzano	Inizio maggio
Valsugana	Tenna – Caldonazzo – Levico – Barco	Inizio maggio ed inizio giugno
Alta val di Non	Rumo – Preghena - Brez - Castefondo – Fondo – Lover – vervò	Fine giugno

GRANDINE 13 MAGGIO 2022



GRANDINE 13 MAGGIO 2022


Grandinata intensa	Tuenno – Pavillo – Tassullo – Predaia - Piana Rotaliana - Val di Cembra
Grandinata molto intensa, con danni importanti alla vegetazione	Piccola zona di Tassullo e Taio, Dardine, Priò, Vervò, Tres, Faver e Segonzano
Stadio fenologico al momento dell'evento	Da fine fioritura a $\emptyset$ dei frutticini di 14 mm
OSSERVAZIONI	
Negli areali nei quali si sono avuti dei forti danneggiamenti della vegetazione (piante completamente defogliate o con una facciata defogliata), nei giorni successivi alla grandinata si è assistito ad una maggiore cascola dei frutticini dovuta al forte stress subito dalla pianta.	
CONTROLLI	
Val di Non- Predaia - misurazioni effettuate nei frutteti con copertura antigrandine distesa, verificando i casi nei quali alcune piante restavano scoperte dalla rete (file/piante di bordo). Le piante fuori rete hanno avuto una cascola più accentuata, portando ad una riduzione delle mele rimaste in pianta che varia dal - 20 % al - 50%	

CIMICE ASIATICA: 2022


N° medio di CIMICI/SITO nei controlli settimanali



N° asiatiche giovani



N° asiatiche adulti



Controllati mediamente 68 punti di monitoraggio alla settimana. Nel grafico sono riportate solo le settimane con almeno

OSSERVAZIONI

- Situazione generalmente tranquilla sia in fondovalle che in collina
- Si osserva un anticipo sul ciclo di sviluppo di circa 7-10 giorni.
- Le temperature elevate dell'ultimo periodo non sembrano favorire l'attività della cimice

Andamento metereologico e fitosanitario melo 2022

