

MATTEO DE CONCINI

Relazione tecnica

Andamento metereologico e fitosanitario melo 2023


- 14 giugno 2023 -



Andamento meteorologico melo 2023

 2023
 2022


Andamento meteo **Romagnano**: pioggia, temperature massime e minime giornaliere



Andamento meteorologico melo 2023

 2023
 2022


Andamento meteo **Romagnano**: pioggia, temperature massime e minime giornaliere



Andamento meteorologico melo 2023

Asciutto 2 m
Bagnato 50 cm


Andamento meteo **Romagnano**: pioggia, temperature massime e minime giornaliere



Andamento meteorologico melo 2023

 2023
 2022


Andamento meteo **Cles**: pioggia, temperature massime e minime giornaliere



Andamento meteorologico melo 2023

— Asciutto 2 m
— Bagnato 50 cm (segno)


Andamento meteo Cles: pioggia, temperature massime e minime giornaliere



Andamento meteorologico melo 2023




T° aria 2 m



Andamento meteorologico melo 2023




T° aria 2 m




Andamento meteorologico melo 2023

T° aria 2 m



Andamento meteorologico melo 2023



T° aria 2 m



Rilievi eventi di gelata al 13 aprile 2023



Val di Non e Sole	
Giacitura degli appezzamenti	% media di fiori anneriti
Avvallamenti	53%
Pianeggiante	36%
Leggera pendenza	32%
Pendenza	11%
Media Totale	36%
Varietà generalmente più colpite	Red,Canada,Fuji



	% media di fiori anneriti	Note
Fondovalle Val d'Adige	23%	Danno maggiore nei frutteti con fenologia più avanzata
Fondovalle Valli del Sarca	21%	I danni variano da un 10 ad un 60%, e variano molto vista la disformità territoriale.
Colline valli del Sarca	26%	
Valsugana	30%	Nelle zone più fredde fino ad un 60 %
Varietà generalmente più colpite	Gala	

Rilievi eventi di gelata a fine maggio

Valli del Noce

- La situazione generalmente è positiva, con danni da freddo confinati negli areali solitamente pianeggianti o negli avvallamenti
- I danni qualitativi sono stati verificati in particolare sulla varietà Fuji, in maniera minore su altre varietà (es. Gala)
- Nella maggior parte dei casi la mancata produzione si osserva nella parte bassa della pianta, fino ad 1,5/2 metri da terra.
- Le varietà più colpite risultano Red Delicious, Fuji e Renetta Canada, a seguire Gala e Golden nella misura in cui sono piantumate negli areali più soggetti.




Val d'Adige- Vallagarina – Fondovalle delle Valli del Sarca

- La situazione è generalmente positiva, in questi areali il freddo ha provocato danni in maniera disforme, in quanto le temperature sono spesso state “al limite”.
- Le varietà generalmente più colpite sono Gala e Red delicious.
- I danni attualmente visibili sono principalmente di tipo quantitativo.
- Nella maggior parte dei casi la mancata produzione si osserva nella parte bassa della pianta, fino ad 1,5 metri da terra.
- La mancata produzione nella parte bassa della pianta, è nella maggior parte dei casi attribuibile ai danni da freddo.

Valsugana – colline delle Valli del Sarca

- La situazione generalmente è positiva, con danni da freddo confinati negli areali solitamente pianeggianti o negli avvallamenti
- I danni visibili sono principalmente di tipo quantitativo
- Nella maggior parte dei casi la mancata produzione si osserva nella parte bassa della pianta, fino ad 1,5 metri da terra.
- Le varietà più colpite risultano Gala Golden e Red, nella misura in cui sono piantumate negli areali più soggetti.



EVENTI SIGNIFICATIVI

Areale	Note
Val d'Adige (Aldeno)	24 maggio (intensa)
Valle dei Laghi (Dro)	Fine maggio (lieve)
Alta val di Non (da Dovenà verso il lago, lungo il Novella)	2 giugno (intensa)
Bassa val di Non (Terres)	Inizio giugno (intensa)
Centro val di Non (Coredo)	10 Giugno (lieve)
Alta val di Non (Preghena e Rumo)	10 Giugno (intensa)
Alta val di Non (Romeno e Malgolo)	10 Giugno (lieve)



Dovenà



Terres



Preghena

Bilancio melo 2023: pezzatura frutticini

Dati preliminari di inizio giugno

	Rispetto al 2022	Rispetto al 2021	Rispetto al 2020	Rispetto al 2019	Rispetto alla media 10 anni (2011-2020)	Rispetto all'annata peggiore (2013)
Inizio giugno	«Uguale» da -4 a + 2,5 mm	Da + 5 mm + 9 mm	Da -0 mm a -1 mm	da +3 a + 6 mm	Da +2 a +3 mm	Da +8 a +15



Bilancio fitosanitari melo giugno 2023

AVVERSITA'/TEMATICA	
Ticchiolatura	😊
Oidio	😞 😓
Colpo di fuoco	😊
Alternaria	?
Moria	😊
Afide lanigero	😊 😞
Afide cenerognolo	😊 😞
Cimice asiatica	?
Gelo	😞
Grandine	😊 😞
Scottature	?
Pezzature	😊



Andamento metereologico e fitosanitario melo 2023



GRAZIE

